

Zimmer  
frei

## Das Nasch-Zimmer (Beerenobst)

. . . bietet dem Besucher einen Einblick in die Welt der Nasch-Früchte. Neben Obstspalieren und Säulenobst finden sich hier ein Himbeer-Tipi und mobile Pflanzkisten mit Erdbeeren und anderen kleinen Leckereien. Den Übergang zum

Obst-Zimmer bildet eine Reihe aus Beerensträuchern mit Johannisbeeren und Stachelbeeren in unterschiedlichen Sorten und Erziehungsformen.

### Klimabaum Weiße Maulbeere

**Botanisch:** *Morus alba*

**Wuchshöhe:** 8 bis 10 m, **Kronenbreite:** 4 bis 6 m

**Herkunft:** China, Mandschurei, Korea

**Blatt:** sehr variabel von herzförmig bis tief gelappt, groß, oberseits glänzend hellgrün, in China als Futter für Seidenraupenzucht in Verwendung

**Blüte:** kurze hängende Ähren, V - VI, gelbgrün

**Frucht:** weiß bis rosa, wie längliche Brombeeren, ca. 1 bis 2,5 cm, essbar, Geschmack leicht süßlich

**Standort:** O, anspruchslos, bevorzugt trockenere, kalkhaltige, lockere Böden in geschützten Lagen

**Besonderheit:** trockenheitsverträglich und wärmeliebend, seit Jahrhunderten in Kultur, unter Friedrich dem Großen für die Seidenraupenzucht in Deutschland eingeführt

### Gestaltungselemente

- **Spalier- und Säulenobst** als Sichtschutz
- **Beerensträucher-Hecke** zwischen Nasch- und Obst-Zimmer
- **Hochbeet** aus Lärchenholz und Krustenplatten als Abschluss
- **Himbeer-Tipi** mit Herbsthimbeeren
- **Pflanzkisten** aus Holz mit Naschbepflanzung

### Spalier- und Säulenobst

Detaillierte Informationen zur Erziehung von Spalier- und Säulenobst finden Sie im angrenzenden Obst-Zimmer.

#### Spalier Birne 'Alexander Lucas' - *Pyrus communis* 'Alexander Lucas'

**Reifemonat:** Sept./Okt.    **Lagerfähig bis:** Dezember    **Verwendung:** Tafelobst

**Wissenswert:** gute Winterbirne mit saftig süßem Geschmack; 1874 von Alexandre Lucas in einem Wald bei Blois in Frankreich entdeckt

#### Säulen-Apfel 'La Torre' - *Malus domestica* 'La Torre'

**Reifemonat:** Oktober    **Lagerfähig bis:** Mai    **Verwendung:** Tafelobst

**Wissenswert:** Züchtung des Bayerischen Obstbauzentrums; vereint viele positive Eigenschaften für den Hausgarten; ähnelt im Geschmack der Sorte 'Topaz'

**Säulenäpfel wachsen gestaucht und bilden nur selten Seitentriebe aus.  
Wenn sich Seitentriebe bilden, müssen diese weggeschnitten werden.**

#### Spalier Holz-Quitte - *Pseudocarya sinensis*

**Reifemonat:** Oktober    **Lagerfähig bis:** -    **Verwendung:** Wildobst

**Wissenswert:** sehr seltenes Gehölz mit guter Winterhärte; blüht im Mai mit zartrosa Blüten, Herbstlaub mit prächtigem Farbenspiel in Gelb-, Orange- und Rottönen; braun-grau gemusterte Rinde als weiterer Blickfang; keine besonderen Bodenansprüche; Früchte sind essbar und gut zu Quittengelee und -mus zu verarbeiten

## Beerensträucher in Spindelerziehung

Johannisbeeren und Stachelbeeren können als Sträucher erzogen werden. Für kleinere Gärten wird mittlerweile oft die **kompaktere Spindelerziehung** empfohlen. **Die Vorteile sind:** größere Beeren, längere Trauben, weniger Verrieselung, leichteres Pflücken, höhere innere Fruchtqualität. Für die Spindelerziehung bleibt pro Pflanze nur ein Trieb stehen, den man an einen ca. 1,80 m hohen Bambusstab festbindet. Der Mitteltrieb wächst ohne weiteren Anschnitt nach oben. Triebe, die aus dem Boden kommen, müssen in krautigem Zustand laufend weggerissen werden. Sollten die **Seitentriebe am Mitteltrieb** länger als **30 cm** werden, kürzt man sie nach der Ernte auf 25 cm Länge ein. So garniert sich die Mittelachse mit kurzem Fruchtholz, an dem lange Trauben mit großen Beeren wachsen. Bei Stachelbeeren lässt man dagegen 2 bis 3 Haupttriebe nach oben wachsen, da diese schwächer wachsen als Johannisbeeren.

### Rote, schwarze und weiße Johannisbeeren ·

#### *Ribes in Sorten: 'Jonkheer van Tets', 'Rodneus', 'Bona' und 'Blanka'*

<b>Reifemonat:</b> Juni bis Juli	<b>Blütezeit:</b> April	<b>Beerenfarbe:</b> rot, schwarz und weiß
----------------------------------	-------------------------	---

**Wissenswert:** **'Jonkheer van Tets':** sehr frühe Sorte, hohe Erträge, mit großen, dunkelroten Einzelbeeren an langen, dichtbesetzten Trauben; gilt als eine der besten Sorten für den Hausgarten; für Frischverzehr, Saft, Grütze u. a.

**'Rodneus':** sehr ertragreich, mittelspät reifend, mit dunkelroten, sehr dicht sitzenden, mittelgroßen Beeren an langen Trauben, fein säuerlich

**'Bona':** frühe Sorte, mittlerer bis hoher Ertrag, mit sehr großen schwarzen Einzelbeeren; süßlicher Geschmack, hoher Zierwert aufgrund des dekorativen Laubes; mehltautolerant

**'Blanka':** weiße Beersorte mit großen Einzelbeeren in langen Trauben, mittelspät reifend, aromatisch (lange hängen lassen, dann mild und süßlich)

### Rote und gelbgrüne Stachelbeeren · *Ribes uva-crispa in Sorten: 'Captorator' und 'Invicta'*

<b>Reifemonat:</b> Juli - August	<b>Blütezeit:</b> April - Mai	<b>Beerenfarbe:</b> rot und grüngelb
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

**Wissenswert:** **'Captorator':** stachelarme Sorte, hohe Erträge, mittelspät reifend, mit roten Stachelbeeren, süßsäuerlicher Geschmack; selbstfruchtend; auch für Kübel geeignet; mehltautolerant

**'Invicta':** grüngelbe Sorte, stark bestachelt, hohe Erträge, mittelfrüh reifend, saftig, sehr geschmackvoll; geringe Anfälligkeit für Mehltau

## Unser Himbeer-Tipi

Ob frisch vom Strauch oder auf dem Kuchen, Himbeeren verwöhnen uns mit ihrem unwiderstehlichen Aroma. Als Marmelade holen Sie den Sommer zurück auf den winterlichen Frühstückstisch. **Herbst-Himbeeren** haben den Vorteil, dass die Ruten des Vorjahres einfach im März knapp über dem Erdboden abgeschnitten werden können. Die Ruten treiben neu aus und bilden ab Ende Juni Blüten. Ab Ende Juli bis in den Herbst hinein kann geerntet werden, viel länger als bei herkömmlichen Sommer-Himbeeren. Beim Anbau im Garten ist ein Drahtrahmen mit zwei quer gespannten Drähten in 60 und 100 cm Höhe zum Abstützen der Ruten empfehlenswert.

In unserem begehbaren **Himbeer-Tipi** werden die Himbeer-Ruten in Form eines Tipis an Naturhölzern nach oben gezogen und beranken im Laufe des Sommers das Tipi immer mehr.



## Rote und gelbe Herbst-Himbeeren -

### *Rubus idaeus* in Sorten: 'Autumn Bliss', 'Polka', 'Golden Everest'

**Reifemonat:** August bis Oktober **Blütezeit:** Juli bis Sept. **Beerenfarbe:** rot und gelb

**Wissenswert:** 'Autumn Bliss': ertragreiche Sorte; früheste Herbstsorte, ab Mitte August reifend, mittelrote Früchte, saftig, aromatisch, kräftiger Geschmack; trägt bis zum ersten Frost madenfrei; widerstandsfähig gegen Wurzelfäule, Blattläuse und Rutensterben

'Polka': ab Mitte August reifend, hoher Ertrag, selbstfruchtend, gute Haltbarkeit, sehr große, kegelförmige Früchte mit dunkelroter Farbe, gutes Aroma; eignet sich hervorragend als Kuchenbelag und für Marmeladen; robust und pflegeleicht

'Golden Everest': goldgelbe Beeren, ertragreich, süß und aromatisch, selbstfruchtend

## Pflanzkisten mit Naschfrüchten

In unseren kleinen mobilen **Pflanzkisten** zeigen wir über die ganze Saison Naschfrüchte, die sich gut im Garten und Hochbeet, aber auch auf Balkon und Terrasse in Ampel, Balkonkasten und Topf ziehen lassen.

### Erdbeere - *Fragaria x ananassa*

**Familie:** Rosengewächs **Nutzung:** Früchte **Sortenbeispiele:** *Belmona Summer, Gasana F1*

**Wissenswert:** mehrjährig wachsend; im Sommer süße, aromatische Früchte, ideal für den Frischverzehr; Verarbeitung zu Kuchen oder Marmelade

### Möhre - *Daucus carota*

**Familie:** Doldenblütler **Nutzung:** Wurzelgemüse **Sortenbeispiele:** *Pariser Markt, Sugarsnax F1*

**Wissenswert:** frisch gezogene Möhrchen sind besonders zart und aromatisch; orangefarbene Sorten mit viel gesundem Carotin; aber auch sehr gesunde weiße, gelbe, rote, purpurfarbene Sorten

### Tomate - *Lycopersicon lycopersicum*

**Familie:** Nachtschattengewächs **Nutzung:** Fruchtgemüse **Sortenbeispiele:** *Johannisbeertomaten*

**Wissenswert:** kleinfrüchtige Tomatensorten mit reichem Fruchtbehang und besonders aromatischem Geschmack, Fruchtzucker und Säure hier besonders konzentriert; rote Früchte beinhalten gesundes Lycopin, gelbe und orangefarbene Früchte Carotin

### Fingergurke - *Cucumis sativus*

**Familie:** Kürbisgewächs **Nutzung:** Fruchtgemüse **Sortenbeispiele:** *Ministar F1*

**Wissenswert:** sehr kleine, nur fingergroße Früchte, reichtragend; schmecken knackig und aromatisch süß, wenig wässrig; bei regelmäßiger Ernte und warmer Witterung reifen sie täglich heran

### Andenbeere - *Physalis peruviana*

**Familie:** Nachtschattengewächs **Nutzung:** Fruchtgemüse **Sortenbeispiele:** *Goldvital, Schönbrunn*

**Wissenswert:** wärmebedürftig, nicht frosthart, buschig wachsend; gelb-orangefarbene, kirschgroße Naschfrüchte, angenehm süß-säuerlich; sind reif zum Naschen, wenn der Hüllkelch leicht bräunlich und trocken und die Beere leicht gelb gefärbt ist

### Radies - *Raphanus sativus*

**Familie:** Kreuzblütler **Nutzung:** Knollengemüse **Sortenbeispiele:** *Raxe, Rudy, Eiszapfen*

**Wissenswert:** zart, aber aromatisch scharf; im Sommer in kurzer Zeit erntereif (3-4 Wochen); in verschiedenen Farben (rot, weiß, gelb, weiß-rot); je schärfer, umso mehr gesunde Pflanzenstoffe